

ANULIND®

Crème

Zur Linderung der Symptome bei Hämorrhoiden und Analbeschwerden

Hilft bei Schmerzen, Juckreiz und Brennen. Emulsion mit Applikator



30ml e

WIE WIRKT ANULIND®?

ANULIND® Crème ist eine sanfte und leicht hydrophile Emulsion zum Schutz und zur Pflege von entzündeten Analbereichen, die hilft die Symptome bei inneren und äußeren Hämorrhoiden oder anderen Irritationen im Analbereich zu lindern. Die Emulsion bildet eine physikalische Barriere und schützt so die empfindliche Haut. Gleichzeitig wird die Besiedelung mit Bakterien und Verunreinigung aus der Umgebung, welche die Entwicklung von Hämorrhoiden fördern, reduziert.

Aufgrund ihrer besonderen Zusammensetzung hilft ANULIND® Crème bei einer physiologischen Wiederherstellung der inneren und äußeren Analbereiche. Die Crème erzeugt einen Gleitfilm, der schützt und erfrischt.

Weiters hat ANULIND® Crème pflegende Eigenschaften, die dazu beitragen, Beschwerden und Reizungen in der Analregion zu verhindern und so Schmerzen, Brennen, Jucken und ähnliche Symptome zu lindern.

Nach dem Auftragen von ANULIND® Crème wird das behandelte Hautareal weich und mit Feuchtigkeit versorgt, was die Bildung von Irritationen und Hautrissen verhindert. Der Gleitfilm erleichtert die Darmentleerung und reduziert so das Verletzungs- und Schmerzempfinden, der physiologische Heilungsprozess wird gefördert.

ANULIND® wurde nicht in der Schwangerschaft und Stillzeit getestet. Konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie schwanger sind oder stillen.

ANWENDUNGSGEBIETE VON ANULIND®:

- Innere und äußere Hämorrhoiden
- Anale und perianale Beschwerden wie Juckreiz und Brennen
- Bei besonderer Empfindlichkeit für anale Reizungen

WIE VERWENDE ICH ANULIND®?

ANULIND® Crème wird in den inneren Analbereich und auf das umgebende Areal aufgetragen, um die mit Hämorrhoiden und Analreizungen verbundenen Symptome zu lindern.

• Äußere Anwendung

Wenn die Beschwerden im äußeren Analbereich auftreten, tragen Sie die ANULIND® Crème mit dem Finger auf und massieren Sie diese sanft ein. Die Crème kann auch vor dem Stuhlgang verwendet werden, um die Darmentleerung zu erleichtern (bitte achten Sie darauf, dass Sie die betroffene Region und Ihre Hände sowohl vor als auch nach Anwendung der Crème gründlich reinigen).

• Innere Anwendung

ANULIND® Crème verfügt über einen speziellen Applikator, der auf die Tube geschraubt werden kann. Dies ermöglicht es Ihnen, die Crème im inneren

Analbereich aufzutragen. Achten Sie darauf, dass Sie die betroffene Region und Ihre Hände sowohl vor als auch nach Anwendung der Crème gründlich reinigen.

1. Vor der ersten Verwendung schrauben Sie die Kappe von der Tube und durchstechen Sie die Versiegelung der Tube mit der Rückseite der Kappe.
2. Schrauben Sie den Applikator auf die Tubenöffnung und führen Sie ihn sanft in den Analkanal ein (Sie können vor Gebrauch auch eine dünne Schicht Crème auf den Applikator auftragen, damit das Einführen erleichtert wird).
3. Drücken Sie die Tube zusammen, bis eine passende Menge Emulsion herauskommt.
4. Nach Gebrauch reinigen Sie den Applikator sorgfältig mit einem feuchten Papiertuch und lassen Sie ihn trocknen.
5. Danach stecken Sie die Schutzkappe wieder auf den Applikator.

DOSIERUNG:

Tragen Sie die Crème je nach Bedarf bis zu drei/vier Mal pro Tag auf.

Um Analreizungen oder Hautrisse zu verhindern, können Sie ANULIND® Crème einmal pro Tag auftragen.

INHALTSSTOFFE:

Wasser, Olusöl, Paraffinöl, Vaseline, Cetareth-20, Cetearylalkohol, hydriertes Stärkehydrolysat, Süßmandelöl, Isostearylalkohol, PEG-75-Stearat, Glycerinstearat, Propylenglycol, Dimethicon, PEG-8-Stearat, Isodecylaurat, Roskastaniensamenextrakt, Dikalium-Glycyrrhizat, Benzylalkohol, Phenoxyethanol, Oleylalkohol, Extrakt des asiatischen Wassernabels, hydriertes Lecithin, Kaliumsorbat, Stearyl-Glycyrrhetinat, Maltodextrin, Allantoin, Paraffin, Dinatrium-EDTA, Gelbholzfrucht-extrakt, Milchsäure, Butylenglycol, Laureth-3, Hydroxyethylcellulose, Tocopherol (Vitamin E), Acetyldipeptid-1-Cetylester

UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN:

Von ANULIND® Crème sind keine unerwünschten Wirkungen bekannt, jedoch

- Sie dürfen ANULIND® Crème nicht verwenden, wenn Sie gegen einen der Bestandteile überempfindlich reagieren.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, tragen Sie eine kleine Menge Emulsion auf die Innenseite des Unterarms auf. Wenn gereizte rote Stellen auftreten, sollten Sie ANULIND® Crème nicht verwenden.
- Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker über jede unerwünschte Wirkung oder wenn die Symptome anhalten.

WARN- UND

ANWENDUNGSHINWEISE:

Nur zur Verwendung durch eine Person bestimmt, nicht mit anderen Personen teilen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Trocken und vor Licht geschützt bei Raumtemperatur (zwischen 5° und 30°C) lagern. Keine beschädigten Tuben verwenden. Nach dem auf der Außenverpackung angegebenen Ablaufdatum nicht mehr verwenden. Nicht schlucken. Augenkontakt vermeiden. Im Falle von Augenkontakt gründlich mit Wasser

ausspülen und danach medizinischen Rat einholen. Nach Gebrauch den Applikator sorgfältig reinigen, trocknen und wieder verschließen. Holen Sie sich ärztlichen Rat, wenn Ihre Symptome länger als 30 Tage anhalten. Anulind wurde nicht in der Schwangerschaft und Stillzeit getestet. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen Arzt.

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES:

Wenn die Beschwerden anhalten oder wiederkommen, sollten Sie auf jeden Fall Ihren Arzt aufsuchen.

Konsultieren Sie Ihren Arzt auch, wenn sich die Symptome verschlechtern oder wenn Entzündungen, Infektionen oder allergische Reaktionen auftreten.

MÖGLICHE

WECHSELWIRKUNGEN:

Zurzeit sind keine Wechselwirkungen von ANULIND® Crème mit Arzneimitteln oder anderen Medizinprodukten bekannt. Wenn Sie aber über einen längeren Zeitraum gleichzeitig andere Arzneimittel einnehmen, im speziellen blutverdünnende Medikamente oder Beruhigungs- und Schlafmittel, fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie ANULIND® Crème anwenden.

GRÖSSE:

30ml Tube

Mit wiederverwendbarem Applikator

Medizinprodukt



0477

Hergestellt in Italien von:



Biokosmes s.r.l. – socio unico
Via dei Livelli 1,
23842 Bosisio Parini (LC) Italy



VERTRIEB:

Germania
Pharmazeutika GmbH
1150 Wien, Österreich
www.germania.at

SYMBOL	BEDEUTUNG
0477	CE Zertifizierungsstelle 0477
	Hersteller
	Vor Anwendung Gebrauchsinformation lesen
	Zwischen 5°C und 30°C aufbewahren
	Ablaufdatum
	Chargennummer

Diese Packungsbeilage
wurde zuletzt überarbeitet
im Jänner 2026.